



DIEMER

spol. s r.o.

БЮКЛІН біоцид

BIOCLEAN biocid

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ НА БАЗІ КВАРТЕРНИХ АМОНІЙНИХ СОЛЕЙ, АЛЬДЕГІДУ ТА ІЗОПРОПАНОЛУ

Реєстраційне посвідчення Державного Комітету ветеринарної медицини
AA-00390-03-09 від 01.10.2014 р.

Область застосування :

використовується для дезінфекції об'єктів ветеринарного-санітарного нагляду та профілактики інфекційних захворювань тварин та птиці:

- пташники, свинарники, корівники і т.д.;
- приміщення для приготування кормів для тварин;
- транспортні засоби;
- санітарні бійні;
- дезінфекція устаткування і приміщень інкубаторіїв , інкубаційних яєць;
- заповнення дезбар'єрів;
- аерозольна дезінфекція повітря.

Властивості:

Засіб активний відносно грам позитивних і грам негативних бактерій (включаючи вегетативні і спорові форми), вірусів (як оболонкових, так і без оболонкових), грибів, дріжджів, цвілі та водоростей в концентрації 0,25 - 0,5%. Резистентність мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів відсутня. Біологічно розкладаємо, не викликає корозію матеріалів, не пошкоджує поверхні, може застосовуватися методами зрошення, розпилення, піни, аерозольно, для заправки дезкилимків і дезбар'єрів і т.д.

Склад:

- два четвертинно-амонійних з'єднання (дідецілдіметіламоній хлорид-4,0% і дідецілдіметілбензиламоній хлорид-8, 5%), що істотно розширює спектр групи четвертинного амонію;
- глутаровий альдегід (50% р-р, який не містить метанол) -5,0%;
- ізопропанол-15, 0%.

Запропоновані концентрації активних речовин дозволяють підтримувати позитивні результати з дезінфекції.

Технічні характеристики:

- безбарвна рідина;
- густина - 1,0 кг/л;
- рН (1%) - 7,0-7,5

Затосування:

При профілактичній дезінфекції використовують 0,25 % -ний водний розчин препарату при нормі витрати 0,2-0,25 л / 1 м² площі. Експозиція - 30 - 60 хвилин.

При вимушеній дезінфекції, інфекційних захворюваннях бактеріальної та вірусної етіології і заключній дезінфекції використовують 0,5 % -ний водний розчин препарату при нормі витрати 0,2-0,25 л / 1 м² площі. Експозиція - 60 - 120 хвилин.

При дезінфекції методом дрібнодисперсного розпилення використовують водний розчин препарату : 0,75 л концентрату + 4 л води / 1000м³ об'єму (19 % -ний водний розчин).

Робочий розчин розпилюють при вимкненому вентиляції з часом експозиції – не менше 3 -х годин.

Для аерозольної дезінфекції повітря в присутності тварин використовують метод холодного туману, концентрація робочого розчину - 0,5 %.

Волога дезінфекція в присутності тварин: концентрація робочого розчину-0,1-0,25%.

Термін використання:

36 місяців з дня виготовлення

Зберігання:

оберігати від морозу

Виробник:

TOB DIEMER, Trenčín

Упаковка:

10 кг, 20 кг, 30 кг



IHR NEUES ZEICHEN

ТОВ «ДИЕМЕР-УКРАЇНА»
б-р Верховної Ради,
34 , офіс 630
02660, м. Київ,
Україна

тел./факс:
0445938734

моб.:

+38 050 462 39 01
+38 067 935 52 10

e- mail:
sv_m2003@ukr.net